

## PRISE EN CHARGE DES INTOXICATIONS PAR LA PERMETHRINE CHEZ LE CHAT

### Traitement symptomatique

- Anticonvulsivants :
  - Commencer par du diazépam
  - Si inefficace ou durée d'action trop courte, passer à d'autres anticonvulsivants au choix parmi : phénobarbital, pentobarbital, médétomidine, kétamine, propofol...
  - Ne pas s'acharner à traiter les trémulations avec des anticonvulsivants si elles impactent peu l'animal
- Traitements à visée digestive :
  - Si troubles digestifs ou si léchage : pansement digestif si l'animal peut déglutir
- Perfusion (NaCl, Ringer...) et diurétiques inefficaces mais perfusion envisageable si hypotension.

### Lavage / shampoing

- Laver systématiquement le chat en entier à l'eau tiède et au liquide vaisselle ou au savon de Marseille
- Bien sécher l'animal car l'hypothermie majore la gravité de l'intoxication
- Une sédation est souvent nécessaire pour un lavage efficace
- Le lavage peut être répété (selon les mêmes modalités) tous les jours en cas de persistance / récurrence des symptômes

Molécule	Nom déposé	Posologie
Diazépam	Diazépam TVM®	Voie IV ou intra-rectale, renouvelable : 0,5-2 mg/kg (cf. Notice)
Médétomidine	Domitor®, Dorbène®, Dormilan®, Médétor®, Sédator®	Chat : 50-150 µg/kg IV ou IM
Phénobarbital	Gardéna®	IV : 2-6 mg/kg puis perfusion continue 2-4 mg/kg/h (délai d'action : 20-30 min)
Pentobarbital	Pentobarbital Ceva® (Doléthal®, Euthasol Vet®)	IV : 2-15 mg/kg (moyenne 4 mg/kg) toutes les 6-8 h ou perfusion continue 1,5-5 mg/kg/h
Propofol	Propovet®, Vétofol®	IV lente : 1-6 mg/kg puis perfusion continue : 6-36 mg/kg/h (si durée >12h, risque hémolyse chez le chat)
Kétamine	Imalgène®, Clorkétam®, Kétamine Virbac®...	IV : 5 mg/kg (en association avec diazépam ou médétomidine)

### Traitement ELI

